

# BOLETÍN SAO

## SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE ORNITOLOGÍA



**Volumen XVI (Suplemento especial) – Junio de 2006**

### **EDITORIAL**

#### **El loro Orejiamarillo: ¿una especie todavía en estado crítico de amenaza?**

El conocimiento sobre la distribución del Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*) en Colombia ha mejorado dramáticamente en los últimos años. Aunque la preocupación por las poblaciones de esta especie ha sido manifestada en la inclusión de su nombre en varios listados de aves amenazadas desde hace más de 20 años (King 1981, Hilty 1985, Anónimo 1992, Collar *et al.* 1992, BirdLife International 2000), sólo hasta hace menos de 10 comenzaron los primeros esfuerzos intensivos por encontrar, estudiar y proteger las poblaciones de esta especie en el país.

En 1998 tuvo inicio el “Proyecto *Ognorhynchus*”, cuyo objetivo principal era encontrar poblaciones del Loro Orejiamarillo en Colombia tras meses de búsquedas fallidas en el Ecuador. En ese momento, los únicos registros recientes de la especie provenían de la región del Río Toche, un palmar exuberante donde la especie había sido registrada intermitentemente desde principios del siglo XX (Chapman 1917, Salaman *et al.* 1999), por lo cual las primeras búsquedas del proyecto estuvieron concentradas en dicha región. Sin embargo, tras varios meses no fue encontrada la especie y la hipótesis que estuviera extinta parecía abrumadoramente posible (Salaman *et al.* 1999).

No obstante, en abril de 1999 fue confirmado el registro de una nueva población en la cercana localidad de Roncesvalles, Tolima (López-Lánus *et al.* 1999). Aunque la noticia fue motivo de alegría, la evaluación preliminar del estado poblacional de la especie era preocupante ya que sólo 81 individuos fueron censados (Anónimo 2005). Al año siguiente se halló una segunda población del Loro Orejiamarillo que habitaba los bosques relativamente bien conservados de Jardín (Antioquia) y otros municipios del suroeste antioqueño, aliviando en parte la preocupación por el futuro de la especie (Toro y Flórez 2001).

Con los nuevos registros publicados en este número del Boletín SAO, quedan documentadas ahora cuatro poblaciones del Loro Orejiamarillo en Colombia y el futuro de esta especie ahora no parece tan incierto como en 1998. El hecho que estos registros correspondan a Yarumal (Antioquia) y Cajamarca (Toli-

ma), localidades cercanas a donde la especie fue registrada hace más de 90 años (Frijolera y Río Toche respectivamente, Chapman 1917) es un indicio que la especie podría estar presente en otras localidades históricas que no han sido considerablemente deforestadas y que han sido pobremente muestreadas en los últimos años.

Aunque es indudable que la amenaza sobre el hábitat del Loro Orejiamarillo es latente, la evidencia proveniente de las ampliaciones en la distribución de la especie y el crecimiento de sus poblaciones sugieren que es hora de reevaluar su estado de amenaza. Por ejemplo, la última evaluación global del estado de amenaza de esta especie utiliza las estimaciones de tamaño poblacional y distribución de este loro para el año 2000 (BirdLife International 2005). En un mundo donde las listas rojas cada año crecen mas, sería gratificante ver una especie descender un puesto del escalafón de la UICN.

### **Literatura citada**

Anónimo. 1992. Especies de vertebrados extintas y en peligro de extinción en Colombia. En: Halffer, G. (ed.). La diversidad biológica de iberoamérica. Págs. 217-224. Acta Zoológica Mexicana, Volumen especial. México.

Anónimo. 2005. [http://www.proaves.org/article.php?id\\_article=109](http://www.proaves.org/article.php?id_article=109). Visitado 04/13/2006.

- BirdLife International. 2000. Threatened birds of the world. Lynx editions and BirdLife International, Cambridge and Barcelona.
- Chapman, F. M. 1917. The distribution of bird-life in Colombia. Bulletin of the American Museum of Natural History 36:1-729.
- Collar, N. J., L. P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L. G. Naranjo, T. A. Parker, y D. C. Wege. 1992. Threatened Birds of the Americas: the ICBP/ IUCN Red Data Book. International Council for Bird Preservation, Cambridge, UK.
- Hilty, S. L. 1985. Distributional changes in the Colombian avifauna: a preliminary blue list. Ornithological Monographs 36: 1000-1012.
- Hilty, S. L. y W. L. Brown. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- King, W. B. Endangered birds of the world: the ICBP bird red data book. Smithsonian Institution Press and International Council for Bird Preservation, Washington D. C.
- López-Lánus, B., P. G. W. Salaman, A. Quevedo. 1999. Proyecto Ognorhynchus: estudio y conservación del Loro Orejiamarillo en Colombia. Boletín SAO 10:7-10.
- Salaman, P. G. W., B. López-Lánus y N. Krabbe. 1999. Critically endangered: Yellow eared parrot *Ognorhynchus icterotis* in Colombia. Cotinga 11: 39-41.
- Toro, J. L. y P. Flórez. 2001. Una nueva población del Loro Orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*) en los Andes de Colombia. Boletín SAO 12: 47-51.

**Jorge Velásquez-Tibatá**  
Department of Ecology and Evolution  
State University of New York at Stony Brook  
NY 11790-5245, USA  
[jorge@life.bio.sunysb.edu](mailto:jorge@life.bio.sunysb.edu)