

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS DE AVES




Streptoprocne rutila
Vencejo de Collar Castaño – Chestnut-collared Swift

Una pareja de *Streptoprocne rutila* perchados en horas de la noche en una cueva del Municipio de Anorí.



Streptoprocne rutila
Vencejo de Collar Castaño – Chestnut-collared Swift

Un individuo de *Streptoprocne rutila*, y un nido de la misma especie. Ambos debajo del mismo puente, en el municipio de Jardín.



Streptoprocne rutila
Vencejo de Collar Castaño – Chestnut-collared Swift

Un nido aparentemente abandonado del Vencejo Cuello Castaño en el municipio de Yarumal, extremo norte de Antioquia.

El Vencejo de Cuello Castaño (*Streptoprocne rutila*) es una especie ampliamente distribuida en el territorio Colombiano. Sin embargo al igual que la mayoría de las especies de vencejos que habitan el país, su historia natural ha sido pobremente documentada. Estos registros fotográficos provenientes de tres localidades del departamento de Antioquia en los municipios de Anorí, Yarumal y Jardín, están entre los pocos publicados sobre esta especie en su hábitat natural. Estas imágenes evidencian que estos vencejos usan cuevas como dormitorios, también que están empleando construcciones humanas, como pequeños puentes sobre carreteras, para anidar.

Lucas S. Barrientos^A, **Paulo C. Pulgarín-R.**^B, **Jorjany M. Botero-O.**^C & **Taran Grant**^D.

Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. AA. 1226 Medellín-Colombia.

A. lucas.barrientos@gmail.com

B. pulgarinp@gmail.com

C. venceja@gmail.com

D. Postdoctoral Fellow American Museum of Natural History Central Park West at 79th Street New York, NY 10024, USA. grant@amnh.org