

Densidad poblacional e historia natural de *Thryothorus nicefori* en Soatá (Boyacá)

Alejandro Hernández-Jaramillo ^{AB}, Daira Chavarro-Villagran ^B, Oswaldo Cortes-Herrera ^B, Sandra Alarcón-Nieto ^B, Jenny Paola Gallo ^B & Giovanni Chavez-Portilla ^B

^A Corporación OCOTEA

^B Grupo de observadores de aves de Soatá

Email: Oswaldo_aves@yahoo.com, ataraxiajam@yahoo.com, daxiluna@yahoo.com

Entre los meses de julio y diciembre de 2006 y enero a febrero de 2007, estimamos la densidad poblacional y determinamos la dinámica temporal de (*Thryothorus nicefori*), ave endémica de Colombia y EN PELIGRO CRITICO. Hicimos observaciones mensuales en hábitat xerofítico y cercas vivas en las veredas de Soatá, durante las cuales obtuvimos 52 registros de la especie, la mayor parte de ellos en cercas vivas. La mayor abundancia se presentó en las veredas de Costa y Espinal y no observamos diferencias en los dos periodos climáticos. En cuanto al patrón de actividad se observó que la cobertura de cerca viva es un espacio de alimentación, refugio y anidación para este cucarachero. La ampliación de la frontera agrícola, ganadera y deforestación, son factores que afectan al cucarachero en el área de estudio, por lo cual el mantenimiento de las cercas vivas es un elemento fundamental para la protección de la especie. Este trabajo contribuye al Objetivo 1, Resultado 2 de la Estrategia Nacional para la Conservación de las Aves en cuanto aporta al incremento en calidad y cantidad de investigaciones sobre todos los aspectos de la biología de las aves colombianas.

Palabras clave: Ave amenazada, Boyacá municipio de Soatá, *Thryothorus nicefori*.