

El Piquero Peruano (*Sula variegata*) y la Gaviota Rabihorcada (*Creagrus furcatus*) en la Isla de Gorgona.

En el anterior número del Boletín SAO (Estela et al. 2007) publicamos un artículo sobre nuevos registros para el Parque Nacional Natural Gorgona, en el cual comentábamos observaciones del Piquero Peruano (*Sula variegata*) y de la Gaviota Rabihorcada (*Creagrus furcatus*). En septiembre de 2007 visitamos nuevamente Gorgona y pudimos obtener fotografías de estas dos especies, las cuales presentamos a continuación para documentar plenamente los registros anteriores.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2007 visitamos los islotes rocosos del costado sur y occidental de Gorgonilla y encontramos aproximadamente 100 individuos de Piquero Peruano (Fig. 1 y 2). El 6 de septiembre 2007 también visitamos las rocas del Horno en el extremo norte de Gorgona, donde encontramos una Gaviota Rabihorcada tirada sobre unas rocas, en una posición totalmente anormal y que demostraba un estado de enfermedad del animal (Fig. 3). La recogimos y la tuvimos en observación (Fig. 4) hasta que finalmente murió ese mismo día y la preparamos como ejemplar de colección (IAvH 8358), en el interior del intestino se le encontró un tipo de piedra (3.5 x 2.7 cm), de textura muy dura pero liviana, probablemente un cálculo intestinal, que le obstruía totalmente la cloaca, por lo cual el animal tenía retenida una cantidad significativa de materia fecal.

En nuestro artículo pasado sugerimos que estas dos especies son más comunes en esta zona del Pacífico colombiano que lo previamente sugerido. Estas nuevas observaciones dan mayor peso a dicho comentario, ya que fueron hechas en un mes diferente a los previamente reportados, y al menos para el Piquero en una abundancia mucho mayor que lo observado anteriormente en el País.



Fig. 1. Grupo de Piquero Peruano (*Sula variegata*), identificables por tener la cabeza blanca, descansando en las paredes verticales de la roca conocida como La Barca en el costado sur de Gorgonilla, junto al Piquero Patiazul (*Sula nebouxii*), el cual se encuentra sobretodo en la parte alta y plana del islote (Foto: F. Estela).



Fig. 2. Piquero Peruano en islotes del costado occidental de Gorgonilla. Esta especie es fácilmente distinguible por la cabeza totalmente blanca, pico y patas grises, comparado con el Piquero Patiazul que tiene cabeza gris o café y sus patas son azules, aunque de distintos tonos según la edad (Foto: J. Zamudio).



Fig. 3. Gaviota Rabihorcada (*Creagrus furcatus*) capturada en las rocas del Horno en el extremo norte de Gorgona (Foto: J. Zamudio).



Fig. 4. Gaviota Rabihorcada (*Creagrus furcatus*) totalmente enferma, mantenida en observación (Foto: F. Estela).

Agradecimientos

Nuestra visita en septiembre fue posible gracias un crucero de investigación organizado por Fundación Yubarta y financiado por Conservación Internacional – Colombia. En campo contamos con la colaboración del personal de CIMAD, el PNN Gorgona y la Estación Científica Henry von Prael.

Referencias

Estela, F. A., Jeisson A. Zamudio, J. A. & G. Cadena-López. 2007. Adiciones a la avifauna marina del Parque Nacional Natural Gorgona. Boletín SAO XVII (1): 31-35.

Felipe A. Estela & Jeisson Zamudio

Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia - CALIDRIS. Cra. 24 # 4-20, Cali, Colombia.
E-mail: felipe.estela@gmail.com, jeanzaesula@hotmail.com